



Synthèse des recommandations applicables aux travailleurs de la santé (TdS) symptomatiques en contexte de COVID-19

Dernière mise à jour le 29 septembre 2023

Aucun dépistage COVID-19



Dépistage COVID-19



Important !

Lors de l'apparition de symptômes compatibles à la COVID-19 et/ou à la réception d'un test positif, les employés doivent aller compléter le formulaire sur le *Centre d'assistance* afin d'obtenir la consigne appropriée à leur situation.

[Centre d'assistance COVID au personnel - CISSS de Chaudière-Appalaches \(cissca.com\)](https://www.cissca.com)

N.B. le maintien au travail avec N95 est possible pour les travailleurs immunocompétents avec Fit Test à jour. Les travailleuses enceintes ainsi que les travailleurs considérés immunosupprimés doivent demeurer isolés à la maison selon les consignes reçues suite à la complétion du formulaire sur le *Centre d'assistance*

Groupe de symptômes (sx) compatibles avec la COVID-19

- **sx de fièvre:** T° buccale ≥38,1 °C
- **sx d'allure grippale (SAG / VRS):** toux, mal de gorge, difficultés respiratoires, écoulement ou congestion nasale, perte soudaine d'odorat ou de goût
- **sx de gastro-entérite d'allure virale :** diarrhée, vomissements
- **sx généraux:** mal de tête, fatigue intense, douleurs musculaires généralisées, importante perte d'appétit, douleur abdominale

Auto-isolement au travail (modalités)

- Respect strict des mesures PCI et consignes en vigueur
- Effectuer ses déplacements dans son propre véhicule
- Ne pas prendre de pauses et repas dans un lieu partagé

Quoi faire en cas d'absence du travail de plus de 5 jours?

L'employé doit aviser sans délai son supérieur immédiat et faire parvenir un billet médical d'arrêt de travail au Service de gestion de la présence au travail (servicesst.cissca@ssss.gouv.qc.ca)

* Dans certains cas, les Cliniques de dépistage du CISSS-CA offre le dépistage de l'influenza/VRS. Les clientèles cibles sont:

- Personnes admissible au traitement contre l'influenza (ex. Tamiflu)
- Personnes âgées de 70 ans et plus;
- Personnes vivant sous le même toit qu'une personne à risque de complications de l'influenza
- Femmes enceinte (2e ou 3e trimestres)