

DESTINATAIRES : Au chirurgiens, gynécologues, anesthésistes, ainsi qu'aux gestionnaires des blocs opératoires et de la planification chirurgicale

DATE : Le 19 octobre 2020

OBJET : Mise à jour de la conduite au bloc selon le niveau de risque

Ce document présente la version du 19 octobre des mesures à prendre pour se protéger adéquatement lors d'une IMGA au bloc opératoire.

Vous y trouverez les mesures de protection indiquées pour la procédure prévue dans un tableau et sous forme d'algorithmes.

*Contenu approuvé par Dre Sarah Masson-Roy
Diffusion acceptée par Marco Bélanger*

TABLEAU 1 : Approche de gestion de risque aux IMGA au bloc opératoire en contexte de pandémie de COVID-19 chez usager n'ayant jamais fait la COVID-19 ou l'ayant fait il y a ≥3 mois (résolu)^{1,2}

Approuvé par service infectiologie 2020-10-14

Symptômes compatibles ⁵	Risque épidémiologique	Résultat d'un test COVID-19 datant de <48 hrs		
		Négatif	Non disponible ou aucun test <48 hrs	Positif
Présence	Peu importe	Niveau de précaution 3³	Niveau de précaution 3	Niveau de précaution 3
Questionnaire impossible	Peu importe	Niveau de précaution 2	Niveau de précaution 3	Niveau de précaution 3
Aucun	Contact étroit ⁴ <14 jours	Niveau de précaution 3	Niveau de précaution 3	Niveau de précaution 3
	Contact épidémiologique autre (unité en éclosion-contact élargi)	Niveau de précaution 2	Niveau de précaution 3	Niveau de précaution 3
	Questionnaire impossible	Niveau de précaution 2	Niveau de précaution 3	Niveau de précaution 3
	Aucun contact épidémiologique	Niveau de précaution 1	Niveau de précaution 2	Niveau de précaution 3

1 - Pour un usager ayant fait la COVID-19 il y a moins de 3 mois (critères de guérison remplis), utiliser le niveau de précaution 1

2 - Critères de guérison : Se référer à la note du 8 septembre 2020 : Évaluation pour la levée des mesures d'isolement des usagers hospitalisés/hébergés pour COVID-19 positif (mise à jour de la note du 11 août 2020)

3 - En présence d'un diagnostic alternatif clair et d'un test COVID-19 négatif dans les dernières 48 h, utiliser niveau de précaution 1.

4 - Contact étroit = contact à moins de 2 mètres durant au moins 10 minutes cumulées survenu dans les 14 derniers jours avec une personne infectée, suspectée ou en investigation pour la COVID qui ne portait pas de masque.

5 - Voir tableau dernière page pour les symptômes compatibles

TABLEAU 2 : Détails des niveaux de précautions

	Niveau de précaution 1	Niveau de précaution 2	Niveau de précaution 3
Type de salle	Standard	Standard	COVID-19
Pratiques générales pour intervention sans intubation/extubation ni chirurgie IMGA	Précautions usuelles + en vigueur pandémie (masque de procédure + protection oculaire)	Précautions usuelles + en vigueur pandémie (masque de procédure + protection oculaire)	Précaution COVID-19 Gouttelettes/Contact + protection oculaire
Précautions additionnelles si intubation/extubation ou ventilation au masque	Précautions usuelles + en vigueur pandémie (masque de procédure + protection oculaire)	Protection-N95/Contact + protection oculaire (N-95, jaquette, gants, protection oculaire) pour les personnes présentes lors de l'intubation ou extubation Attente du renouvellement d'air non requis	Protection Aériennes/Contact renforcées (N-95, jaquette, gants, protection oculaire) pour les personnes présentes lors de l'intubation ou extubation Attendre temps de renouvellement d'air
Précautions additionnelles lors d' IMGA* * selon la liste des IMGA au bloc	Précautions usuelles + en vigueur pandémie (masque de procédure + protection oculaire)	Protection-N95/Contact + protection oculaire (N-95, jaquette, gants, protection oculaire) Pour le temps de l'intervention Renouvellement d'air non requis après l'intervention	Protection Aériennes/Contact renforcées (N-95, jaquette, gants, protection oculaire) Pour le temps de l'intervention Attendre temps de renouvellement d'air après l'intervention
Choix de salle de réveil	Salle standard Précautions usuelles + en vigueur pandémie (masque de procédure + protection oculaire)	Salle standard post-extubation Précautions usuelles + en vigueur pandémie (masque de procédure + protection oculaire)	Salle COVID-19 Précautions COVID-19 Gouttelettes/Contact + protection oculaire

TABLEAU 3: Symptômes compatibles avec la COVID-19¹

<p>Un symptôme ou plus parmi les suivants (symptômes du groupe A) :</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Fièvre (plus de 38,0oC); OU➤ Toux (récente ou chronique exacerbée); OU➤ Difficulté respiratoire; OU➤ Perte d'odorat d'apparition brutale sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût
<p>OU</p>
<p>Deux critères ou plus parmi les suivants (symptômes du groupe B) :</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Un symptôme général parmi les suivants : douleurs musculaires, céphalée, fatigue intense, perte d'appétit importante;➤ Mal de gorge;➤ Un des symptômes suivants : diarrhée, nausée, vomissement

¹ <https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/formation-gestion-cas-covid19-fiche-types-de-cas-définitions.p>