


Communication COVID-19



DESTINATAIRES : Tous les médecins et les employés du CISSS de Chaudière-Appalaches réalisant des interventions médicales qui génèrent des aérosols (IMGA) en dehors des milieux hospitaliers et tous les gestionnaires de ces secteurs

DATE : Le 18 décembre 2020

OBJET : Mesures de précautions additionnelles pour les interventions médicales qui génèrent des aérosols (IMGA) hors milieux hospitaliers, trajectoire des fit-tests et trajectoire pour commander des masques N95 (modification à la note du 26 octobre 2020)

Étant donné la situation épidémiologique actuelle, et ce jusqu'à nouvel ordre, des mesures de précaution additionnelles s'appliquent à la région de Chaudière-Appalaches lors de la réalisation d'IMGA pour les usagers non suspectés (absence de symptômes), non dans un milieu en éclosion et non atteints de la COVID-19 pour lesquels un isolement de type protection Aériennes/Contact renforcées est requise.

Les mesures de précaution additionnelles tiennent compte des éléments suivants :

- Absence de chambre à pression négative dans ces milieux.
- Délais de plus ou moins sept heures pour obtenir un changement d'air complet des chambres.
- Impossibilité de faire des tests de dépistage de la COVID-19 aux 48 heures pour des raisons techniques et logistiques dans le contexte actuel.
- IMGA particulières à risque reconnu ou à risque possible.

Il est à noter qu'à la suite de la diffusion de cette note, une coordination du déploiement des masques N95 ou P100 et des fit-tests sera réalisée.

Pour toutes les IMGA à risque reconnu ou possible chez un usager non symptomatique, non dans un milieu en éclosion et non atteint de la COVID-19, une protection(N-95/P100)-contact (jaquette et gants)-oculaire est requise (voir liste à la fin de la présente note de service). La liste des IMGA est à jour en se basant sur le dernier document de l'INSPQ en date du 2 novembre 2020. Vous y remarquerez une modification importante pour ce qui est des soins de trachéostomies : « un changement de pansement à ce niveau, une aspiration des sécrétions à

l'embouchure de la canule, l'application de soins topiques au site ou le changement de canule ne seraient pas considérées des IMGA. »¹

Voici quelques particularités à tenir compte dans ce contexte :

1. Idéalement, tous les usagers devant avoir des IMGA devraient être placés dans des chambres seules.
2. Si ceci ne peut être réalisé, évitez que d'autres usagers soient dans la pièce au moment de l'intervention (IMGA) et, dans le cas contraire, ils devraient porter un masque de procédure pendant l'IMGA.
3. Il n'est pas nécessaire de faire de tests COVID-19.
4. La procédure est réalisée avec la **porte fermée**. Il n'est pas nécessaire d'attendre le renouvellement d'air avant de reprendre les activités dans la pièce. Continuer de porter les EPI requis selon les recommandations pour votre milieu.
5. Minimiser le nombre d'intervenants présents pendant la procédure.
6. **EPI requis pour l'IMGA** : Masque N95 ou P100, protection oculaire, jaquette standard et gants non stériles.
7. **Pour un usager avec IMGA qui a eu la COVID-19** et dont la maladie est résolue depuis moins de trois mois (critère de guérison rempli), des précautions standards sont alors adéquates (masque de procédure et protection oculaire). Au-delà de trois mois, respecter les mesures décrites dans le présent document.

Trajectoire pour les fit-tests

Nous vous rappelons que pour les fit-tests, vous devez suivre la trajectoire de demande officielle. La trajectoire, les formulaires associés ainsi que l'horaire des fit-tests sont disponibles dans l'intranet. Vous pouvez consulter la [note de service](#) diffusée le 21 septembre dernier à ce sujet.

Trajectoire pour commander des masques N-95

Pour les milieux ayant déjà déployé la pratique du port du masque N-95 auprès de la clientèle IMGA lors de la première vague au printemps dernier, la procédure à suivre pour commander vos masques N-95 demeure la même, c'est-à-dire d'acheminer votre demande par courriel auprès de madame Johanne Deschênes (johanne.Deschenes@ssss.gouv.qc.ca). Lors de la transmission de votre demande, il sera obligatoire de fournir les informations suivantes :

- Numéro de l'unité administrative
- Nom du service
- Quantité requise pour une période de sept jours à la fois
- Adresse de livraison
- Nom de la personne qui doit recevoir l'envoi

Les livraisons s'effectueront dans un délai d'environ 48 heures ouvrables, et ce, par l'entremise des routes de transport régulières.

Pour les milieux n'ayant pas déployé la pratique à ce jour, il sera important dans un premier temps de communiquer par courriel avec madame Johanne Deschênes (johanne.Deschenes@ssss.gouv.qc.ca) afin de procéder à l'élaboration des calculs de quotas de distribution selon les besoins (nombre d'usagers IMGA, nombre d'interventions quotidiennes nécessitant le port du N-95, etc.). Par la suite, les commandes pourront être réalisées par courriel auprès de madame Johanne Deschênes, tel que mentionné ci-haut.

¹ <https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2960-intervention-medicale-generant-aerosol-covid19.pdf>

Équipement requis	Type d'IMGA	Liste des IMGA
Protection contact-N-95/P100-oculaire est requise	IMGA à risque reconnu	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Intubation et extubation endotrachéale ➤ Bronchoscopie ➤ Réanimation cardio-pulmonaire (excluant compressions thoraciques) ➤ Ventilation manuelle avant l'intubation ➤ Aspiration des sécrétions trachéales en circuit ouvert (usager intubé ou trachéotomisé) ➤ Induction d'expectorations (technique avec instillation de salin) ➤ Aspiration nasopharyngée (ANP) chez l'enfant
	IMGA à risque possible	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ventilation non invasive en pression positive via masque facial (ex. Bipap, CPAP, « breath stacking », « cough assist device ») ➤ Trachéotomie et soins de trachéostomie : Il est important de spécifier ici qu'il s'agit de la trachéotomie, soit le geste chirurgical, qui est considéré une IMGA ainsi que l'aspiration profonde des sécrétions par trachéostomie. ➤ Intervention chirurgicale par voie naso ou oropharyngée ➤ Chirurgie thoracique
Pas de protection supplémentaire à ce qui est déjà en place	IMGA à risque non documenté	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Oxygénothérapie par voie nasale à haut débit (ex. : optiflow, AIRVO, Oxymiser) ➤ Procédures d'endoscopie digestive ➤ Échographie transoesophagienne (ETO) ➤ Insertion et retrait d'un drain thoracique ➤ Interventions en ophtalmologie qui n'impliquent pas les voies lacrymales, les sinus ou les canalicules ➤ Laryngoscopie ➤ Traitements par nébulisation (incluant provocation à la méthacholine)
	Ne sont pas des IMGA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Oxygénothérapie conventionnelle avec masque facial et lunette nasale conventionnelle ➤ Écouvillonnage nasopharyngé ➤ Insertion de tube nasogastrique, jéjunostomie ou gastrostomie ➤ Biopsie transthoracique (BTT) ➤ Aspiration nasopharyngée chez l'adulte ➤ Soins de trachéostomies tels que : changement de pansement à ce niveau, aspiration des sécrétions à l'embouchure de la canule, l'application de soins topiques au site ou le changement de canule

*** Pour les usagers COVID-19 positifs, veuillez demander un avis PCI.**