


Communication COVID-19



DESTINATAIRES : Tous les médecins et pharmaciens de l'Hôtel-Dieu de Lévis

DATE : Le 22 octobre 2020

OBJET : Offre de soins pharmaceutiques à l'unité COVID de l'Hôtel-Dieu de Lévis

Dans le contexte de pandémie actuelle et à la suite de l'ouverture de l'unité de soins COVID au 5^e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis, les pharmaciens ont réussi à dégager des ressources pour offrir des soins pharmaceutiques à l'unité, en soutien aux équipes médicales.

Ainsi, un pharmacien est présent depuis quelques jours à l'unité de soins, l'équivalent d'une demi-journée par jour en semaine, généralement en après-midi. L'intensité et le moment de présence pourront être revus éventuellement en fonction de l'évolution des besoins et des ressources disponibles.

Nous vous invitons à prendre connaissance de l'offre de soins pharmaceutiques pour cette unité, jointe à la présente. Le pharmacien interviendra de façon systématique dans les dossiers des usagers dont l'admission est en raison de la COVID-19, en lien avec le traitement spécifique et de support de ces usagers (remdesivir, corticothérapie, thromboprophylaxie, antibiothérapie). De plus, une attention particulière sera portée aux usagers recevant certains médicaments ciblés.

Par ailleurs, les pharmaciennes pourront être disponibles sur consultation pour des besoins spécifiques en regard d'un problème lié à la pharmacothérapie ou à une condition médicale pour laquelle des suggestions ou des ajustements médicamenteux peuvent être requis.

Les pharmaciens ont à cœur d'apporter leur contribution aux soins des usagers dans le contexte particulier que nous vivons actuellement, et pourront apporter un soutien aux équipes médicales.

Nous vous remercions de votre collaboration habituelle.

« Signature autorisée »

Dominique Rousseau, pharmacienne
Chef adjointe aux soins pharmaceutiques
Département régional de pharmacie

p. j. Offre de soins pharmaceutiques COVID

Contenu et diffusion approuvés par : Marco Bélanger

Effectifs planifiés : 0,5ETC (HDL)
(Lundi au vendredi)

MODES D'INTERVENTIONS

Intervention systématique : Le pharmacien intervient dans les dossiers des usagers selon des critères prédéterminés. En fonction des ressources disponibles, le délai d'intervention varie selon les niveaux de priorité préétablis.

Intervention sur consultation : Le pharmacien intervient en réponse à une demande de consultation dans le dossier d'un usager présentant une problématique ou une situation clinique le requérant. Selon la nature de la demande, le délai de réponse varie habituellement de 24 à 72 heures et s'insère dans les priorités selon le type de demande et le jugement du pharmacien.

INTERVENTIONS SYSTÉMATIQUES

Critères d'intervention	Actes pharmaceutiques possibles	Priorité
Usager admis dont une divergence majeure a été identifiée au BCM	<input checked="" type="checkbox"/> Réaliser le bilan comparatif des médicaments (BCM) <input checked="" type="checkbox"/> Analyser et évaluer la pharmacothérapie <input checked="" type="checkbox"/> Ajuster la pharmacothérapie <input checked="" type="checkbox"/> Prolonger une ordonnance	1
Usager admis en raison de la COVID, en lien avec le traitement spécifique et de support <ul style="list-style-type: none"> - Remdesivir - Corticothérapie - Thromboprophylaxie 	<input checked="" type="checkbox"/> Réaliser l'histoire médicamenteuse <input checked="" type="checkbox"/> Analyser et évaluer la pharmacothérapie <input checked="" type="checkbox"/> Initier la pharmacothérapie <input checked="" type="checkbox"/> Ajuster la pharmacothérapie <input checked="" type="checkbox"/> Vérifier l'impact de la pharmacothérapie	1
Usager recevant une antibiothérapie IV (antibiogouvernance – réduction du spectre, durée, relai IV/PO, pharmacocinétique)	<input checked="" type="checkbox"/> Analyser et évaluer la pharmacothérapie ciblée <input checked="" type="checkbox"/> Ajuster la pharmacothérapie <input checked="" type="checkbox"/> Prescrire et interpréter des analyses de laboratoire <input checked="" type="checkbox"/> Vérifier l'impact de la pharmacothérapie	1
Usager sous immunosuppresseur ayant un antécédent de greffe ou sous chimiothérapie / immunothérapie	<input checked="" type="checkbox"/> Analyser et évaluer la pharmacothérapie <input checked="" type="checkbox"/> Ajuster la pharmacothérapie <input checked="" type="checkbox"/> Prescrire et interpréter des analyses de laboratoire <input checked="" type="checkbox"/> Vérifier l'impact de la pharmacothérapie	1
Usager présentant une interaction médicamenteuse significative nécessitant un suivi	<input checked="" type="checkbox"/> Analyser et évaluer la pharmacothérapie <input checked="" type="checkbox"/> Ajuster la pharmacothérapie <input checked="" type="checkbox"/> Prescrire et interpréter des analyses de laboratoire <input checked="" type="checkbox"/> Vérifier l'impact de la pharmacothérapie	1
Tous les usagers de l'unité, réduire la fréquence des interventions auprès des usagers par les infirmières <ul style="list-style-type: none"> - Regrouper les horaires 	<input checked="" type="checkbox"/> Analyser et évaluer la pharmacothérapie <input checked="" type="checkbox"/> Ajuster la pharmacothérapie	2

Critères d'intervention	Actes pharmaceutiques possibles	Priorité
<ul style="list-style-type: none"> - Favoriser posologies moins fréquentes - Modifier l'administration pour IV directe lorsque possible 		
Usager admis recevant de la méthadone	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Analyser et évaluer la pharmacothérapie <input checked="" type="checkbox"/> Ajuster la pharmacothérapie <input checked="" type="checkbox"/> Vérifier l'impact de la pharmacothérapie <input checked="" type="checkbox"/> Liaison / continuité des soins 	2
Usager admis recevant un médicament à index thérapeutique étroit <ul style="list-style-type: none"> - Immunomodulateur ou immunosupresseur hormis greffe - Lithium - Digoxine - Théophylline - Anticonvulsivants (phénytoïne, carbamazépine, acide valproïque, phénobarbital) 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Analyser et évaluer la pharmacothérapie <input checked="" type="checkbox"/> Ajuster la pharmacothérapie <input checked="" type="checkbox"/> Prescrire et interpréter des analyses de laboratoire <input checked="" type="checkbox"/> Vérifier l'impact de la pharmacothérapie <input checked="" type="checkbox"/> Liaison / continuité des soins 	2

INTERVENTIONS SUR CONSULTATIONS

Critères d'intervention	Actes pharmaceutiques	Priorité
Usager présentant un problème ou un symptôme actif pouvant être relié à sa pharmacothérapie : <ul style="list-style-type: none"> - Effets indésirables - Interactions médicamenteuses - Objectif thérapeutique non atteint - Allergies ou intolérances multiples 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Réaliser l'histoire médicamenteuse <input checked="" type="checkbox"/> Analyser et évaluer la pharmacothérapie <input checked="" type="checkbox"/> Initier la pharmacothérapie <input checked="" type="checkbox"/> Ajuster la pharmacothérapie <input checked="" type="checkbox"/> Prescrire et interpréter des analyses de laboratoire <input checked="" type="checkbox"/> Vérifier l'impact de la pharmacothérapie 	Selon type de demande et jugement clinique du pharmacien
Usager admis nécessitant une voie alternative d'administration des médicaments	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Analyser et évaluer la pharmacothérapie <input checked="" type="checkbox"/> Ajuster la pharmacothérapie <input checked="" type="checkbox"/> Prescrire et interpréter des analyses de laboratoire <input checked="" type="checkbox"/> Vérifier l'impact de la pharmacothérapie 	Selon type de demande et jugement clinique du pharmacien
Conditions médicales particulières <ul style="list-style-type: none"> - syndrome gériatrique (délirium, chute, immobilisation) 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Réaliser l'histoire médicamenteuse <input checked="" type="checkbox"/> Analyser et évaluer la pharmacothérapie <input checked="" type="checkbox"/> Initier la pharmacothérapie 	Selon type de demande et jugement

Critères d'intervention	Actes pharmaceutiques	Priorité
<p>-Ajustement médicamenteux dans contexte de soins palliatifs (douleurs, embarras respiratoire, nausées, ...)</p> <p>- Insuffisance rénale</p> <p>- Insuffisance hépatique</p> <p>- Obésité morbide supérieure 40kg/m² ou petit poids (inférieur à 45kg)</p> <p>- ATCD chirurgie bariatrique</p> <p>- Femme enceinte hospitalisée pour la COVID</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ajuster la pharmacothérapie</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Prescrire et interpréter des analyses de laboratoire</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Vérifier l'impact de la pharmacothérapie</p>	<p>clinique du pharmacien</p>