


Communication COVID-19



DESTINATAIRES : Chefs de GMF, infirmières et personnel administratif des GMF, médecins omnipraticiens de Chaudière-Appalaches, chefs médicaux, gestionnaires et infirmières au triage aux urgences et adjointes à la DSP

DATE : Le 17 juin 2021

OBJET : Nouveaux critères de référence en CDÉ et formulaire

Compte tenu de l'évolution favorable de la situation épidémiologique et des données présentement disponibles, le Plan de priorisation des activités cliniques – Secteur de la première ligne (Directive DGAUMIP-004) est suspendu.

Les éléments suivants soutiennent cette directive :

- ✓ Atteinte satisfaisante du taux de vaccination populationnelle;
- ✓ L'ensemble des professionnels de la santé et du personnel administratif de la première ligne recevront leur deuxième dose de vaccin d'ici le 15 juillet;
- ✓ Le statut immunitaire des travailleurs de la santé permet de moduler les indications de retrait du travail en fonction des critères d'exposition à un cas de COVID-19;
- ✓ Maintien de l'application des mesures universelles pour l'ensemble des usagers et leurs proches qui seront vus en première ligne;
- ✓ Respect des mesures de prévention et de contrôle des infections (PCI) dans tous les milieux de première ligne;
- ✓ La fermeture éventuelle des CDÉ prévue pour le 6 septembre 2021;
- ✓ Maintien des mesures de prévention et contrôle des infections (PCI), en vue d'un retour du fonctionnement normal de la 1^{re} ligne.

Veillez donc prendre connaissance de la révision des critères de référence en CDÉ et de la mise à jour du Formulaire de référence (voir en annexe) qui permettront un retour de plusieurs cas en clinique froide. Les modifications du formulaire sont surlignées en jaune. Pour les infirmières au triage, il est à noter que « l'outil décisionnel pour l'infirmière au triage à l'urgence » sera mis à jour sous peu par le MSSS en cohérence avec la modification des critères de référence en CDÉ.

Merci de votre collaboration habituelle!

« Signature autorisée »
Annie Tremblay, M.D.
Directrice adjointe DSP

« Signature autorisée »
Nancy Marois
Coordonnatrice AARAT – DSM

« Signature autorisée »
Julie Jacques
Conseillère cadre DSI

Contenu et diffusion approuvés par Marco Bélanger

FORMULAIRE DE RÉFÉRENCE EN CDÉ (mise à jour, 9 juin 2021)

Les critères suivants permettent de cibler la clientèle devant être vue en CDÉ, mais ne sont pas les critères de diagnostic du COVID-19. Des informations complémentaires suivent le formulaire.

ÉVALUATION DES CRITÈRES DES CLINIQUES DÉSIGNÉES D'ÉVALUATION (CDÉ)	
INFORMATION PATIENT	
Nom, prénom :	Date de naissance :
Adresse complète :	
Adresse courriel :	No. Téléphone :
Nom, prénom du père :	
Nom, prénom de la mère :	
Numéro d'assurance-maladie / date exp :	
INFORMATION DU PROFESSIONNEL SOIGNANT	
Nom et numéro de pratique du professionnel référent :	
No de télécopieur (pour retour note CDÉ au md) :	Téléphone ligne directe :
Répond aux critères de référence en CDÉ :	
CRITÈRES DE RÉFÉRENCE EN CDÉ (Obligatoire)	
Excluant les symptômes associés à la vaccination pour la COVID-19 (voir algorithm #1, page 3, INSPQ) ¹	
Référer en CDÉ tout patient, répondant au moins à l'un des deux critères suivants (cocher toutes les cases appropriées) :	
<input type="checkbox"/> 1) CRITÈRES CLINIQUES : le patient présente \geq 1 SYMPTÔME(S) parmi les suivants <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Fièvre (>38); <input type="checkbox"/> Toux (récente ou chronique exacerbée); <input type="checkbox"/> Difficultés respiratoires; <input type="checkbox"/> Anosmie d'apparition soudaine sans congestion nasale, avec ou sans agueusie; <input type="checkbox"/> Mal de gorge; 	
OU présente \geq 2 SYMPTÔMES parmi les suivants: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Douleur musculaire généralisée non reliée à un effort physique; <input type="checkbox"/> Céphalée; <input type="checkbox"/> Fatigue marquée; <input type="checkbox"/> Perte d'appétit importante; <input type="checkbox"/> Douleur abdominale; <input type="checkbox"/> Vomissement ou nausée; <input type="checkbox"/> Diarrhée (nouvelle ou exacerbée). <input type="checkbox"/> Rhinorrhée ou congestion nasale de cause inconnue ou qui ne répond pas à l'utilisation d'un antihistaminique pendant plus de 48 heures. 	

¹ <https://www.inspq.qc.ca/publications/3095-symptomes-postvaccination-covid-milieux-soins-covid19>

2) CRITÈRES D'EXPOSITION (excluant les patients qui ont reçu deux doses de vaccin il y a plus de 7 jours, qui ont eu un résultat positif à la COVID-19 dans les 6 derniers mois ou qui ont un résultat positif à la COVID-19 + une dose de vaccin)

- Contact domiciliaire : personne asymptomatique habitant avec une personne qui présente des symptômes de la COVID-19 (sauf si la personne contact a reçu un résultat négatif d'un test)
- Patient ayant reçu un diagnostic de COVID-19 dans les **10 DERNIERS JOURS (28 jours si patient immunosupprimé, 21 jours si patient ayant séjourné aux soins intensifs)**;
- Patient ayant reçu un diagnostic de COVID-19 depuis **plus de 10 jours (28 jours si patient immunosupprimé, 21 jours si patient ayant séjourné aux soins intensifs)** et qui ne répond **PAS** aux critères suivants :
 - absence de température X 48h (sans prise d'antipyrétique)
ET
 - amélioration des symptômes x 24 h (excluant toux, anosmie ou agueusie);
- Contact d'un cas de COVID-19 prouvé dans les **14 derniers jours**;
- Séjour de **≥ 48 h** à l'urgence ou l'hôpital dans les **14 derniers jours**;
- Séjour de **≥ 48 h** à l'extérieur du Canada; Patient contacté par la Santé publique ou visé par une annonce populationnelle de la Santé publique.

Clientèle exclue des CDÉ (à orienter vers les urgences)

- Fièvre :
 - Enfants 0 à 3 mois et température rectale ≥ 38 degrés Celsius;
 - Enfants de 3 à 6 mois et température rectale ≥ 39 degrés Celsius, selon l'évaluation clinique d'un professionnel de la santé. Référer à Info-Santé pour une évaluation au besoin;
- Clientèle non réorientable de l'urgence.

Vigilance accrue pour des patients vus en CDÉ qui présenteraient les signes de gravité et risques de dégradation suivants :

SIGNE DE GRAVITÉ ET RISQUE DE DÉGRADATION

- Température : $> 38,2$ degrés Celsius
- Fréquence cardiaque : > 100 bpm
- Rythme et qualité respiratoire : RR > 22 respirations / minute ou tirage ou amplitude
- Saturométrie : < 92 % (patient sans pneumopathie usuelle);
- Tension artérielle : < 90 mm Hg (adulte)
- Altération de la conscience, confusion, somnolence
- Déshydratation ou orthostatisme
- Altération inhabituelle ou soudaine de l'état général; brutal chez le sujet âgé
- Éveil et acuité de réponse anormale

***Toute condition urgente ou sévère devrait être dirigée à l'urgence par le moyen approprié (911 ou autre).**