

## PRISE EN CHARGE D'UN USAGER AYANT EU UN DIAGNOSTIC ANTÉRIEUR DE COVID-19 LORS D'UN RENDEZ-VOUS (R-V) AMBULATOIRE OU À L'URGENCE

Situation de l'utilisateur		Prise en charge	
		RV URGENT ou prise en charge à l'urgence	R-V REPORTABLE
<b>Usager non rétabli</b>	<p><b>Maladie légère ou modérée</b> : ≤ 10 jours suivant le début des Sx (≤ 28 jours si immunosupprimé)</p> <p><b>Maladie sévère</b> : ≤ 21 jours suivant le début des Sx (≤ 28 jours si immunosupprimé)</p>	R-V en zone chaude	Reporter le R-V
<b>Usager rétabli</b> ayant fait une maladie <b>légère ou modérée</b>	<p><b>Plus de 10 jours après le début des Sx (ou de la date du test si a toujours été asymptomatique)</b></p> <p><b>Et</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Amélioration du tableau clinique</b> depuis 24 heures (excluant toux, anosmie et agueusie résiduelle)</li> </ul> <p><b>Et</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas de fièvre depuis 48 heures (sans prise d'antipyrétique)</li> </ul>	R-V en zone froide	R-V en zone froide
<b>Usager rétabli</b> ayant fait une maladie <b>sévère</b> (i. e. admis ou ayant été admis aux soins intensifs en lien avec la COVID-19)	<p><b>Plus de 21 jours après le début des Sx</b></p> <p><b>Et</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Amélioration du tableau clinique</b> depuis 24 heures (excluant toux, anosmie et agueusie résiduelle)</li> </ul> <p><b>Et</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas de fièvre depuis 48 heures (sans prise d'antipyrétique)</li> </ul>	R-V en zone froide	R-V en zone froide
<b>Usager rétabli et immunosupprimé</b>	<p><b>Plus de 21 jours et moins de 28 jours après le début des Sx</b></p> <p><b>Et</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Amélioration du tableau clinique</b> depuis 24 heures (excluant toux, anosmie et agueusie résiduelle)</li> </ul> <p><b>Et</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas de fièvre depuis 48 heures (sans prise d'antipyrétique)</li> </ul> <p><b>Et</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• N'ayant pas eu de PCR de contrôle</li> </ul>	<p>R-V en zone tiède</p> <p>Si cela a un impact sur la poursuite ou non d'un traitement eu (ex : hémato-onco) ou si admission envisagée :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attendre le délai de 28 jours après le début des sx puis transférer en zone froide</li> </ul> <p><b>ou</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réaliser un PCR de contrôle <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si PCR positif : attendre le délai de 28 jours après le début des Sx puis transférer en zone froide</li> <li>• Si 2 PCR négatifs : (à 24 heures d'intervalle) : transférer en zone froide</li> </ul> </li> </ul>	
	<p><b>Plus de 28 jours après le début des Sx</b></p> <p><b>Et</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Amélioration du tableau clinique</b> depuis 24 heures (excluant toux, anosmie et agueusie résiduelle)</li> </ul> <p><b>Et</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas de fièvre depuis 48 heures (sans prise d'antipyrétique)</li> </ul> <p><b>Et</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• N'ayant pas eu de PCR de contrôle</li> </ul>	R-V en zone froide	R-V en zone froide