

# Communication COVID-19



**DESTINATAIRES : Tous les médecins, les gestionnaires et les employés du CISSS de Chaudière-Appalaches**

**DATE : Le 19 octobre 2022**

**OBJET : Prise en charge des usagers ayant des symptômes dans les jours suivants la vaccination COVID-19 en milieu de soins**

Considérant la campagne de vaccination en cours contre la COVID-19, il est important d'effectuer des rappels concernant la conduite à tenir en cas d'apparition de nouveaux symptômes chez un usager nouvellement vacciné.

Si apparition de nouveaux symptômes systémiques post-vaccination tels que :

- Température
- Céphalée
- Perte d'appétit
- Myalgie
- Diminution de l'état général

Surveiller l'évolution des symptômes seulement et assurer les soins courants. Si les symptômes nommés ci-haut **s'aggravent ou perdurent au-delà de 48 heures**, appliquer les précautions additionnelles « Gouttelettes/Contact + protection oculaire + N95 » et procéder au dépistage de la COVID-19 en l'absence d'antécédent de COVID-19 dans les deux derniers mois.

Par contre, en présence d'au moins un des symptômes suivants :

- Anosmie
- Agueusie
- Mal de gorge
- Toux
- Dyspnée
- Rhinorrhée ou congestion nasale
- Nausées ou vomissements
- Douleur abdominale ou diarrhée

Appliquer immédiatement les précautions additionnelles « Gouttelettes/Contact + protection oculaire + N95 » et procéder au dépistage de la COVID-19 en l'absence d'antécédent de COVID-19 dans les deux derniers mois.

Dre Sarah Masson-Roy  
Microbiologiste-infectiologue

Mélanie Gélinas, ICS-PCI  
Chef de service en prévention et  
contrôle des infections – Axe Nord

Isabelle Jacques  
Chef de service en prévention et  
contrôle des infections – Axe Sud

Contenu et diffusion approuvés par : Marco Bélanger