

PROCÉDURE POUR GESTION DE L'USAGER AVEC SUSPICION OU CONFIRMATION DE COVID-19 EN RAC

SI L'USAGER HÉBERGÉ DÉVELOPPE UN OU PLUSIEURS DES SYMPTÔMES SUIVANTS :

- Fièvre;
- Apparition ou aggravation de la toux;
- Difficulté respiratoire;
- Anosmie brutale (perte d'odorat) sans obstruction nasale, accompagnée ou non d'agueusie (perte du goût);
- Céphalée;
- Mal de gorge.

Spécificités gériatriques :

- Fièvre à plus de 37,8°C rectale, ou 1,1°C au-dessus de la température basale sans foyer d'infection clair.

Ou


Symptômes atypiques :

- Détérioration de l'état général (DEG);
- Douleur musculaire;
- Fatigue intense;
- Confusion;
- Atteinte de l'état de conscience (AEC);
- Troubles gastro-intestinaux (ex. : perte appétit, diarrhée).

En tout temps, contactez la ligne *Info Coronavirus* au 1-877-644-4545

Le jour, avisez l'infirmière du programme DI-TSA et DP si apparition des symptômes et suivre les directives de l'infirmière.

- Si l'infirmière du programme DI-TSA et DP ou de ligne info COVID recommande de faire un prélèvement pour le virus SARS-Co-V-2 (COVID-19), l'usager doit être confiné à sa chambre et la mise en place de la **zone jaune doit être faite dans l'immédiat**. Mettre le carton jaune à la porte;
- Il est possible qu'un rendez-vous dans une clinique d'évaluation désignée soit demandé;
- Dans le cas où le déplacement vers une clinique d'évaluation désignée serait impossible, aviser l'infirmière DI-TSA et DP pour effectuer le dépistage;
- Si le dépistage est confirmé positif, **mettre en place la zone rouge dès l'obtention du résultat**. Changer le carton pour le rouge;
- Si le maintien de l'usager à la RAC n'est pas possible, se référer à la *Procédure pour la relocalisation d'un usager majeur infecté à la COVID-19, hébergé en RAC*.




**En tout temps, si changement dans l'état de santé de l'utilisateur, contacter la ligne
Info Coronavirus au 1-877-644-4545**

PRÉPARATION DE L'ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :

- Délimiter devant la chambre de l'utilisateur, une zone au plancher de 2 m², à l'aide d'un ruban adhésif de couleur;
- Placer l'**affiche précautions gouttelettes/contact avec protection oculaire**;
- Placer le carton « zone jaune » sur la porte de l'utilisateur (suspecté). **Mettre en place la zone rouge dès l'obtention d'un résultat positif**;
- Afficher le registre des employés qui entrent dans la chambre à l'entrée de la porte;
- Préparer le chariot :
 - Équipement protection individuel (EPI) : Blouse, boîte de gants, masque et protection oculaire au moment d'aller à la chambre;
 - Solution hydroalcoolique (SHA);
 - Poubelle, pour jeter gants et masque;
 - Sac pour déposer la jaquette si lavable;
 - Contenant avec solution d'Oxivir pour nettoyage de la protection oculaire (voir procédure);
 - Linge microfibre pré-imbibé pour le nettoyage (1 trempage par linge pour éviter la contamination de la solution).

POUR LE PERSONNEL :

- **Avant d'entrer dans la chambre de l'utilisateur :**
 - Approcher le chariot dans la zone délimitée au plancher;
 - Dans l'un des contenants, la solution d'Oxivir doit être préparée pour la désinfection des lunettes à la sortie de la chambre;
 - Signer le registre à la porte de l'utilisateur;
 - Procéder à l'hygiène des mains avec la SHA;
 - Revêtir l'équipement de protection individuelle :
 - Blouse;
 - Masque de procédure;
 - Protection oculaire (visière ou lunette de protection);
 - Gants.
- Restreindre au strict minimum le nombre de personnes présentes requises dans la chambre;
- Pour le changement de literie souillée :
 - Placer la poche de literie souillée directement dans le sac de plastique prévu à cet effet, le refermer avant de le sortir de la chambre.
- **À la sortie de la chambre :**
 - Retirer l'ÉPI selon la procédure :
 - Retirer les gants;
 - Procéder à l'hygiène des mains avec la SHA;
 - Retirer la blouse;
 - Procéder à l'hygiène des mains avec la SHA;
 - Retirer la protection oculaire;
 - Procéder à l'hygiène des mains avec la SHA;
 - Retirer le masque;
 - Procéder à l'hygiène des mains avec la SHA.



- Placer les lunettes de protection dans la solution d'Oxivir pour 5 minutes (voir procédure);
- Désinfecter le chariot et le ranger à l'endroit prévu à cet effet;
- Désinfecter les surfaces se trouvant à l'intérieur de la zone de 2 m² (mur, porte, poignée).

PROCÉDURE SI L'USAGER DÉVELOPPE DES CRITÈRES DE SÉVÉRITÉ TELS QUE :

- Fréquence respiratoire ≥ 24 /min. ou détresse respiratoire aiguë;
- Tout critère jugé sévère par l'intervenant (ex. : altération de l'état de conscience).
 - Contacter l'ambulance (911);
 - S'assurer que la porte est bien fermée;
 - Planification du transfert vers l'hôpital.

NETTOYAGE DE LA CHAMBRE :

- Aviser l'équipe d'hygiène et salubrité de la désinfection requise pour la chambre;
- Immédiatement, après le départ de l'usager, retirer les fournitures et la literie. Disposer selon les procédures habituelles en précautions gouttelettes/contact avec protection oculaire;
- Si le patient a des critères de sévérité, attendre le changement d'air (4 heures) avant de retirer la fourniture et la literie et d'effectuer la désinfection de type *Gouttelettes-Contact* par l'équipe d'hygiène et salubrité.

DURÉE DES MESURES :

La durée des mesures pour les usagers qui présentent des symptômes, qui ont été mis en isolement et qui sont COVID négatif est déterminée par le médecin.

Rédigée par : Direction du programme déficience intellectuelle-trouble du spectre de l'autisme et déficience physique

Validée par : Direction des soins infirmiers, volet pratiques professionnelles et développement clinique
Conseillères en prévention des infections

Contenu et diffusion approuvés par : monsieur Patrick Simard, PDGA