

**ORDONNANCE PHARMACEUTIQUE PRÉIMPRIMÉE**  
**Suspicion de thrombose veineuse profonde (TVP)**  
**du membre inférieur**

Nom : \_\_\_\_\_

Date de naissance : \_\_\_\_\_

Dossier : \_\_\_\_\_

Allergies / intolérance :  Non  Oui, lesquels : \_\_\_\_\_

Poids : \_\_\_\_\_ kg Taille : \_\_\_\_\_ m

PRESCRIPTION RELATIVE À LA CLIENTÈLE RÉFÉRÉE À L'ACCUEIL CLINIQUE POUR UNE SUSPICION DE THROMBOSE VEINEUSE PROFONDE (TVP) DU MEMBRE INFÉRIEUR ET DONT LE DOPPLER DU MEMBRE INFÉRIEUR NE SERA PAS EFFECTUÉ LE JOUR DE LA RÉFÉRENCE.

Voir ANNEXES 2 ET 3 (verso) pour les contre-indications à l'anticoagulation ou à la prise d'anticoagulant oral direct/HBPM

Cocher, si désiré.

**ANTICOAGULOTHÉRAPIE**

Rivaroxaban (Xarelto) 15 mg PO bid, première dose STAT. Cesser si Doppler négatif (CV 157) 12 co Servi 6 à a fois

OU

Apixaban (Eliquis) 10 mg PO bid, première dose STAT. Cesser si Doppler négatif (CV 169) 12 co Servi 6 à a fois

Si grossesse suspectée ou confirmée ou cancer dans les derniers six mois :

Enoxaparine (Lovenox) 1.5 mg/kg SC die \_\_\_\_\_ mg 6 doses Servi 3 à la fois

OU

Dalteparine (Fragmin) 200 unités/kg die \_\_\_\_\_ unités 6 doses Servi 3 à la fois

Signature du médecin : \_\_\_\_\_ # de permis : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_ Heure : \_\_\_\_\_

## ANNEXE 2

CONTRE-INDICATION À RECEVOIR UN ANTICOAGULANT
Usager déjà sous anticoagulants oraux ou héparine de bas poids moléculaire
Saignement actif
Chirurgie récente (< 10 jours)
Troubles de la coagulation ou saignement anormal dans le passé
Hémorragie intracrânienne ou intraoculaire récente (< 3 mois)
Plaquettes < 50 x 10 <sup>9</sup> L
Hypertension non contrôlée (PA systolique > 200 mmHg et/ou diastolique > 110 mmHg)
Ponction lombaire ou procédure péridurale dans les dernières 24 heures

## ANNEXE 3

CONTRE-INDICATION À RECEVOIR UN ANTICOAGULANT ORAL DIRECT (AOD)
Insuffisance rénale avec clairance de la créatinine < 30 mL /min
Hépatopathie significative (ALT 2x la limite supérieure de la normale ou cirrhose hépatique CHILD B ou C CONNUE)
Cancer actif ou chimiothérapie
Obésité morbide (IMC > 40)
Interactions médicamenteuses majeures : antifongiques azolés, inhibiteur de la protéase (VIH), rifampicine, phénytoïne, carbamazépine, phénobarbital, millepertuis
Grossesse suspectée ou confirmée, allaitement
CONTRE-INDICATION À RECEVOIR UNE HÉPARINE DE BAS POIDS MOLÉCULAIRE
Insuffisance rénale avec la clairance de la créatinine < 30 mL /min
Antécédent d'allergie à l'héparine suspectée ou confirmée