


**Rétention urinaire →
(urgent/semi-urgent)**
(ordonnance collective B-6-9)

Exclusion
Température > 38.5 °C, insuffisance rénale aiguë (oligurie, anurie, polyurie, asthénie, œdème, sang avec caillots), clairance de la créatinine ≤ 60ml/min.



MÉDECIN RÉFÉRANT

- ⇒ Remplit une demande pour l'Accueil Clinique
- ⇒ Reçoit résumé de l'investigation par l'infirmière de l'Accueil Clinique
- ⇒ Reçoit consultation du spécialiste

INFIRMIÈRE

- ⇒ Évaluation spécifique
- ⇒ Coordonne l'investigation
- ⇒ Assure le suivi clinique de l'utilisateur lors de l'investigation

MÉDECIN SPÉCIALISTE


- ⇒ Consultation
- ⇒ Investigation spécifique selon évaluation
- ⇒ Décision, traitement

LABORATOIRE

- ⇒ Créatinine, urée
- ⇒ SMU
- ⇒ DCA (non nécessaire si SMU est normal)

Lors du retrait de la sonde :

Instiller par la sonde du Na Cl jusqu'à capacité, maintenir le liquide dans la vessie en clampant la sonde et retirer celle-ci. Vérifier la capacité à uriner à la suite du retrait de la sonde. Noter le résidu et transmettre l'information à l'infirmière du CICES. Si incapacité d'uriner ou rétention à la suite du retrait de la sonde, réinstaller sonde Foley et communiquer avec l'infirmière de l'Accueil Clinique ou l'urologue.



Rendez-vous de consultation avec l'urologue