


**Kyste complexe →
de Bosniak 2/4, 3/4, 4/4
(urgent/semi-urgent)**
(ordonnance collective B-6-6)

Exclusion
→ Hématurie macroscopique en présence de dysurie importante, de rétention urinaire sur caillots, de température >38.5 C ou d'un trauma

Si kyste simple → consultation électorive selon la liste d'attente



LABORATOIRE

- ⇒ Créatinine
- ⇒ Calculer clairance de la créatinine
- ⇒ Azote

IMAGERIE MÉDICALE

- ⇒ Vérifier si réaction à l'iode (mineure ou sévère)

Réaction à l'iode :

Mineure : rougeur au visage, chaleur, nausées, démangeaison, toux, urticaire, œdème localisé

Sévère : difficulté respiratoire ou à avaler, œdème généralisé

Si pas d'antécédent de réaction allergique à l'iode et résultat de la clairance de créatinine ≥ 60 L/min.

Si antécédent de réaction allergique mineure à l'iode et résultat de clairance de la créatinine ≥ 60 mL/min.

Si antécédent de réaction allergique sévère à l'iode et/ou résultat de clairance de la créatinine < 60 mL/min.

Tomodensitométrie rénale 4 phases (avant consultation avec l'urologue)

Tomodensitométrie rénale 4 phases avec préparation pour réaction mineure à l'iode (avant consultation avec l'urologue)

Aviser l'urologue

Rendez-vous de consultation avec l'urologue