Ordre des tubes lors d'une ponction et qualité d'un bon prélèvement

ORDRE DES TUBES POUR LA PONCTION VEINEUSE

Couleur	Description du tube	Nb d'inversions
	Tube de rejet (de vide) OU Hémocultures	8-10 fois
	Tube avec citrate de sodium	3-4 fois
	Tube avec activateur de caillot	5 fois
	Tube avec héparine (sodium/lithium)	8-10 fois
	Tube avec EDTA (métaux lourds)	8-10 fois
	Tube avec EDTA	8-10 fois
	Tube avec fluorure de sodium	8-10 fois
	Tube avec citrate de sodium	8-10 fois
	Tube avec ACD (solution A)	8-10 fois

ORDRE DES TUBES POUR LA PONCTION CAPILLAIRE

Couleur	Description du tube
	Gaz capillaire
	Micro-collecteur avec EDTA
	Micro-collecteur avec héparine (sodium/lithium)
	Micro-collecteur avec ou sans activateur de caillot, avec ou sans gel séparateur

N.B. : Les tubes non mentionnés doivent être prélevés à la fin.

Références : Aide-mémoire de l'IUCPQ sur les prélèvements sanguins

Ordre des tubes lors d'une ponction et qualité d'un bon prélèvement

QUALITÉ D'UN BON PRÉLÈVEMENT

IMPORTANT

- Vérification de la date d'expiration du tube
- Toujours remplir le tube avec anticoagulant selon la capacité de remplissage
- Mélanger le tube doucement immédiatement après le prélèvement
- Procéder à l'identification des prélèvements

IDENTIFICATION CONFORME DES ÉTIQUETTES DE PRÉLÈVEMENTS

- Nom, prénom **ET** numéro personnalisé (RAMQ ou numéro de dossier ou date de naissance)
- Pour la banque de sang : les initiales du préleveur et la date sont obligatoires sur toutes les étiquettes de prélèvement en concordance avec la demande (réquisition)

QUELQUES CAUSES D'HÉMOLYSE LORS D'UNE PONCTION

- Garrot laissé en place plus d'une minute
- Retournement du tube trop brusque
- Présence d'alcool sur le site de ponction
- Ouverture et fermeture de la main de façon répétée et vigoureuse
- Prélèvement de sang via un cathéter, I/V ou micro-perfuseur
- Prélèvement difficile
- Aiguille de calibre trop petit utilisée

CAUSES DE COAGULATION DES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS (TUBES AVEC ANTICOAGULANT)

- Temps de ponction trop long (ponction non franche)
- Inversion insuffisante du tube immédiatement après la ponction

LE PORT DES GANTS EST **RECOMMANDÉ**

LAVAGE OU DÉSINFECTION DES MAINS **OBLIGATOIRE** ENTRE CHAQUE USAGER