Prélèvement oro-nasopharyngé

Matériel requis

- Ensemble de prélèvement contenant l'écouvillon pour prélèvement oro-nasopharyngé et le tube contenant le milieu de transport adéquat pour l'analyse prescrite (Code GRM 16000666 pour l'ensemble avec tube d'eau moléculaire, GRM 16800771 pour tube avec milieu UTM)
- Abaisse-langue (Code GRM : 11003789)

À moins de recommandations différentes du service de prévention et contrôles des infections (PCI), l'équipement de protection individuelle de base est le masque de procédure. En cas de suspicion d'une maladie respiratoire sévère infectieuse (ex. grippe aviaire, MERS), veuillez contacter la PCI.

ÉTAPE 1 PRÉLÈVEMENT OROPHARYNGÉ (GORGE)

➢ **Utiliser un écouvillon stérile :**

- Au besoin, déprimer la portion postérieure de la langue à l'aide d'un abaisse-langue. Insérer l'écouvillon.
- Éviter de toucher les lèvres, les dents, la langue, les joues ou la luette.
- Éviter de toucher les structures de la bouche.
- Frotter la portion postérieure du pharynx et les 2 amygdales avec l'écouvillon.
- Retirer l'abaisse-langue le cas échéant.

ÉTAPE 2 PRÉLÈVEMENT NASOPHARYNGÉ

➢ **<u>Utiliser le même écouvillon qu'à l'étape 1 :</u>**



- Pencher la tête du patient vers l'arrière à 70 degrés.
- Insérer lentement l'écouvillon dans une narine jusqu'au nasopharynx postérieur.
- La profondeur de l'insertion doit être équivalente à la distance entre l'ouverture de la narine et celle de l'oreille externe (figure ci-contre).
- Laisser reposer l'écouvillon pendant 10 secondes pour permettre l'absorption des sécrétions.
- Faire un mouvement de 2-3 rotations complètes et délicates afin d'effectuer une collecte de cellules, puis laisser l'écouvillon en place pendant 5 secondes.
- Retirer l'écouvillon et le déposer dans le milieu de transport pour prélèvement.
- Agiter délicatement l'écouvillon dans le milieu de transport pendant 5 à 10 secondes pour faciliter la libération des cellules et des particules infectieuses dans le milieu liquide.
- Briser la tige de l'écouvillon à l'endroit marqué. L'extrémité de la tige demeurera ainsi dans le milieu de transport.
- Refermer le bouchon du milieu de transport adéqatement.

➢ **Acheminer les écouvillons au laboratoire entre 2 et 8° C**