Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Québec

CONTENANT À UTILISER POUR PRÉLÈVEMENTS AUTRES QUE URINAIRES ET SANGUINS

1 ÉTIQUETTE = 1 TUBE/POT À IDENTIFIER

ATTENTION : LES PHOTOS EMPLOYÉS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT SONT À TITRE INDICATIF SEULEMENT. CERTAINES CARACTÉRISTIQUES DU CONTENANT OU TIGE POURRAIENT ÊTRE SUJET À CHANGEMENT SELON LE FOURNISSEUR (EX. : COULEUR DU COUVERCLE).

CET AIDE-MÉMOIRE N'INCLUS PAS L'ENSEMBLE DES ANALYSES ET INFORMATIONS DISPONIBLES. POUR TOUTES LES INFORMATIONS, VOUS RÉFÉREZ AU RÉPERTOIRE DES ANALYSES DU LABORATOIRE.

Type d'échantillon	Analyse demandée	Code d'analyse	# GRM contenant	Exemple contenant	Information prélèvement	Contenants à acheminer au LABORATOIRE
SELLES	Analyse PCR pathogènes entériques (parasites, virus, bactéries)	PSELL	Enteric transport pathogen (de type Cary Blair) #16000663		Remplir jusqu'à la ligne (maximum).	
	Recherche de parasites par microscopie (SAF) *Justification clinique obligatoire*	PARAT	Milieu de transport parasite SAF #16000664		Remplir jusqu'à la ligne (maximum); Brasser vigoureusement aussitôt prélevé; 3 prélèvements sont recommandés (ou suivre les indications de l'ordonnance).	
	Recherche d'oxyures	MOXYU	Contenant avec spatule autocollante #16002435		Ne pas mettre de selle directement dans le contenant; Appliquer la spatule autocollante sur l'anus, le matin, avant le lever du soleil.	

Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Québec

CONTENANT À UTILISER POUR PRÉLÈVEMENTS AUTRES QUE URINAIRES ET SANGUINS

Type d'échantillon	Analyse demandée	Code d'analyse	# GRM contenant	Exemple contenant	Instruction prélèvement	Contenants à acheminer au LABORATOIRE
SELLES (Suite)	Recherche *Clostridium difficile*	CDAG	Contenant stérile #16002433 ou #16000662		Un seul échantillon est suffisant; Mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe de selle dans le pot.	ou
	Recherche *Helicobacter pylori*	HPSEL				
	Entérocoque résistant vancomycine (ERV)	MERV	ESwab #16001576		Le milieu Enteric transport pathogen (de type Cary Blair, liquide rose) peut aussi être utilisé en cas de pénurie de Eswab.	ou
	Entérobactéries productrices de carbapénémases (EPC) et *Acinetobacter*	ACINE	Enteric transport pathogen #16000663			
	Recherche de sang dans les selles (FIT TEST)	FITX	Bâton collecteur #16000917		Tremper le bâton collecteur dans la selle et refermer le contenant.	
EXPECTO-RATIONS	Recherche de BK (Tuberculose)	MBK	Contenant stérile #16002433		Prélever l'échantillon chez l'usager à jeun; Prélever 1X expectoration.	

Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Québec

CONTENANT À UTILISER POUR PRÉLÈVEMENTS AUTRES QUE URINAIRES ET SANGUINS

Type d'échantillon	Analyse demandée	Code d'analyse	# GRM contenant	Exemple contenant	Instruction prélèvement	Contenants à acheminer au LABORATOIRE
EXPECTO-RATIONS	Culture d'expectorations	VRINF	Contenant stérile #16002433		Faire rincer la bouche de l'usager à l'eau avant de faire le prélèvement; Prélever l'échantillon le matin, à jeun; Les expectorations doivent venir de l'effort de tousser; Les sécrétions de la bouche (salive) ne conviennent pas.	
CULTURE SITE ou PLAIE	Culture superficielle (plaie, vaginale, gorge, oreille, etc.)	PLAIE	Grande tige #16002434 ou Petite tige #22001777		Choisir la longueur de la tige en fonction de la longueur de l'orifice; Utiliser les plus petites tiges pour les petits orifices; Pour culture de pus superficiel, 1 étiquette = 1 tige; **NE PAS** utiliser de ESwab pour ces prélèvements.	ou
	Culture profonde de plaie ou de sinus	PUANA	Grande tige #16002434 ou Contenant stérile #16002433		Pour culture profonde de plaie ou sinus, 1 étiquette = 1 tige; Si liquide biologique, utiliser un pot stérile pour le prélèvement.	ou
LÉSION	PCR Herpes	MUHER	MSwab #16002399		Effectuer le prélèvement au niveau de la lésion muco-cutanée.	

Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Québec

CONTENANT À UTILISER POUR PRÉLÈVEMENTS AUTRES QUE URINAIRES ET SANGUINS

Type d'échantillon	Analyse demandée	Code d'analyse	# GRM contenant	Exemple contenant	Instruction prélèvement	Contenants à acheminer au LABORATOIRE
NASO-PHARINGÉ	Recherche Influenza H1N1, Influenza rapide, Virus syncytial (RSV)	INRSP	Eau molé-culaire #16800772		Après avoir fait le prélèvement, casser la tige dans le liquide; Procéder au prélèvement selon la technique de soins en vigueur; Ne pas utiliser l'eau moléculaire ou UTM pour analyse avec appareil IDNow.	
	Covid-19	COVPC				
	Coqueluche (*Bordetella pertusis*)	BPPCR	UTM #16800771			
	PCR rougeole	PCRRO				
VAGINAL ou URINAIRE	PCR *Chlamydia trachomatis* et *Neisseria gonorrhoeae*	PCRCG	Multi-collect Abbot #16000665		Suivre la procédure de prélèvement pour le kit Abbott multi-collect.	
	PCR *Mycoplasma génitalium*	PCRMG				
	PCR *Trichomonas vaginalis*	PCRTV				
DIVERS	Recherche SARM et *Staphylococcus aureus* Nasal ou plaie	SARM	ESwab #16001576		Effectuer le prélèvement dans les deux narines.	
	Recherche SARM Urine, expectoration ou autre liquide biologique	SARM	Contenant stérile #16002433		Aucune instruction particulière.	