Prélèvements associés aux profils de grossesse

Profil 1er trimestre de grossesse, 10 à 13 semaines de grossesse

Le jeune n'est pas requis au premier trimestre.

Le code GRO1T inclus : ferritine, formule sanguine complète, glucose non à jeun, TSH, typage-dépistage, VDRL, sérologie rubéole IgG, HBs-Ag, anti-HBs, VIH sérologie, sommaires des urines, culture d'urine).

ATTENTION, il y a plusieurs types de sérologie. Vérifier que le code inscrit lors de la saisie de la requête correspond bien à l'analyse demandée.

Dépistage Trisomie 21 (PQDP[1])

Le formulaire AH-611 agit à titre de requête de laboratoire.

Le prélèvement doit être fait entre 10 0/7 et 13 6/7 semaines.

À faire idéalement moins de 48h après l'examen de clarté nucale.

Test génomique prénatal non-invasif (TGPNI)

Le formulaire AH-599 agit à titre de requête de laboratoire.

Si un Test génomique prénatal non-invasif (TGPNI) est demandé, référer la patiente vers un centre de prélèvements affilié à un centre hospitalier. Le TGPNI nécessite des tubes spéciaux que seuls les centres hospitaliers peuvent se procurer.

Profil 3ème trimestre de grossesse, 27 semaines et plus

Le jeune n'est pas requis au troisième trimestre.

Le code GRO3T inclus : ferritine, formule sanguine complète, *hyperglycémie provoquée orale 1h post 50g, typage-dépistage, sommaire d'urine, culture d'urine)

* Lorsqu'une Hyperglycémie Provoqué Orale de 75g est demandée

La patiente doit être à jeun.

Si une demande d'hyperglycémie provoqué orale de 75g est prescrite

- Au 1er trimestre : demander toutes les analyses associées au profil de grossesse GRO1T **sauf glucose non à jeun** et ajouter une hyperglycémie provoquée orale de grossesse 75g (**GL100**) à la requête;
- 3ième trimestre : demander toutes les analyses associées au profil de grossesse GRO3T **sauf l'hyperglycémie provoquée orale une heure post 50g** et ajouter une hyperglycémie provoquée orale de grossesse 75g (**GL100**) à la requête.

En cas de besoin vous référez aux protocoles AN-MPR-B-16 et AN-MPR-B-18.

Prévoir un rendez-vous Ig anti-D (WinRho®) prophylaxie à 28 semaines de grossesse si requis (Rh négatif)

[1] Programme Québécois de dépistage prénatal