EN TOUT TEMPS, IL EST REQUIS DE FAIRE CENTRIFUGER L'URINE AVANT L'ANALYSE MÊME SI AUCUN PRÉTRAITEMENT EST FAIT.

Analyse	Type de prél. (*)	Agent de conservation			Ajustement de pH	Commentaires
		Idéal	Acceptable	Refusé		
5-HIAA	Collecte*	HCL 6N		pH > 4		Diète spéciale (voir : F-CPR-004)
Acides aminés	Miction	AUCUN		HCL 6N		
Acide homovanilique (HVA)	Miction	HCL 6N		pH > 4		
Acides organiques	Collecte/Miction	AUCUN		HCL 6N		
Acide urique	Collecte*	AUCUN		HCL 6N	NaOH	Ajouter goutte à goutte pour obtenir pH à >10
Aldostérone	Collecte*	AUCUN	HCL 6N		HCL 6N	
Bêta-2-microglobulines	Miction	AUCUN				Ajuster à un pH entre 7 et 9
Calcium	Collecte/Miction	AUCUN	HCL 6N		HCL	Ajuster le pH a < 2,5
Catécholamines	Collecte*	HCL 6N		pH > 4		
Citrate	Collecte*	HCL 6N		pH > 4		
Cortisol	Collecte*	AUCUN		HCL 6N		
Créatinine	Collecte/Miction	AUCUN	HCL 6N			
Électrolyte (Na, K, Cl)	Collecte/Miction	AUCUN		HCL 6N		
Électrophorèse / Bence Jones	Collecte/Miction	AUCUN		HCL 6N		
Magnésium	Collecte/Miction	AUCUN	HCL 6N		HCL	Ajuster le pH a < 2,5
Métanéphrine	Collecte*	HCL 6N		pH > 4		
Microalbumine	Collecte/Miction	AUCUN		HCL 6N		
Osmolalité	Collecte/Miction	AUCUN		HCL 6N		
Oxalate	Collecte*	HCL 6N		pH > 4		
Phosphore	Collecte/Miction	AUCUN	HCL 6N		HCL	Ajuster le pH a < 2,5
Phorphyrine (uro+ copro)	Miction	AUCUN		HCL 6N		À l'abri de la lumière; Congelé rapidement
Protéines urinaires	Collecte/Miction	AUCUN		HCL 6N		
Urée	Collecte/Miction	AUCUN		HCL 6N		
Acide vanillymandélique (VMA)	Collecte/Miction	HCL 6N		pH > 4		

*** Pour la clientèle pédiatrique, vérifier dans le répertoire des analyses si une miction est possible.**