

Appel à la vigilance

Transmission interhumaine de *Dermatophilus congolensis*

DESTINATAIRES : Médecins omnipraticiens et spécialistes,
Infirmiers praticiens spécialisés,
Infirmiers en maladies infectieuses,
Médecins et infirmiers des cliniques médicales et cliniques de soins infirmiers privées,
Gestionnaires et professionnels des équipes SIDEP
Gestionnaires et professionnels des équipes de santé publique de la Direction du programme jeunesse,
Pharmaciens

DATE : Le 22 juillet 2026

OBJET : Transmission interhumaine de *Dermatophilus congolensis*

État de situation

Une transmission interhumaine par contact sexuel de *Dermatophilus congolensis* est suspectée en Europe, chez des hommes gais, bisexuels et autres hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (gbHARSAH).

- La dermatophilose est une infection de la peau causée par la bactérie Gram positive *Dermatophilus congolensis*. Elle touche principalement les animaux dans les régions tropicales et subtropicales. La transmission à l'humain est rare et habituellement associée à une exposition zoonotique (bovins, chevaux, moutons, etc.).
- La transmission interhumaine n'avait jamais été documentée auparavant.
- Entre décembre 2025 et juin 2026, un total de 70 cas ont été rapportés en [Europe](#) (France (n=40), Allemagne (n=17), Espagne (n=9) et Suède (n=4)).
 - La plupart des cas étaient des gbHARSAH;
 - Aucun n'avait d'historique de voyage dans des régions tropicales ou de contact avec des animaux;
 - Tous les cas ont rapporté avoir eu des contacts sexuels dans les semaines précédant l'apparition des symptômes, notamment dans des lieux avec sexualité sur place (ex. : sauna).

Caractéristiques cliniques des cas

- Parmi les cas rapportés en Europe, l'infection se manifeste par une éruption cutanée semblable à une folliculite, caractérisée par des papules érythémateuses, vésicules, pustules, croûtes, nodules ou lésions squameuses. Les manifestations cliniques peuvent se retrouver, selon la nature du contact, aux organes génitaux, dans la région périanale, au tronc, aux cuisses, à l'aîne et au visage.
- La bactérie est plus susceptible de se transmettre en cas de rupture de la barrière cutanée et en présence d'humidité.
- Selon les informations collectées lors des enquêtes liées à ces cas, la période d'incubation variait entre 3 et 14 jours. Des données supplémentaires sont requises pour confirmer la période d'incubation.
- Les diagnostics différentiels peuvent s'apparenter à des infections fongiques, parasitaires ou infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) (ex. : mpox, syphilis secondaire, folliculites bactériennes).
- Parmi les cas identifiés en Europe, les infections ont été traitées avec succès selon différentes options :
 - Cefadroxil, cloxacilline ou amoxicilline;
 - Mupirocine topique avec réponse partielle, mais résolution complète après l'administration de la doxycycline;
 - Traitement topique à l'acide fusidique;
 - Pour certains, les lésions se sont résorbées après le traitement pour des ITSS concomitantes (pénicilline benzathine G pour la syphilis, ceftriaxone et doxycycline pour la gonorrhée et la lymphogranulomatose vénérienne).
- Aucun des patients n'a nécessité d'hospitalisation ni n'a rencontré de complications.

Mode de transmission

Selon les connaissances actuelles, le mode de transmission interhumaine n'est pas encore entièrement établi, mais le contact étroit et direct avec les lésions lors de contact sexuel apparaît être le principal mode de transmission. La transmission par contact indirect avec des surfaces ou du matériel contaminé ne peut être exclue.

Situation au Québec

Aucun cas chez l'humain de *Dermatophilus congolensis* n'a été rapporté au Québec.

Recommandations

1. En présence d'un portrait clinique compatible, envisager la dermatophilose dans le diagnostic différentiel.
2. Les laboratoires sont invités à aviser le Laboratoire de santé publique du Québec en cas d'identification d'un *Dermatophilus congolensis* et d'envoyer la souche afin de confirmer par séquençage de l'ARN 16S.
3. AVISER LA DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE SI VOUS SUSPECTEZ DES CAS.

**** Veuillez noter que les connaissances reposent sur des données préliminaires comportant certaines limites et pourraient évoluer. ****

Pour plus d'informations

[Epidemiological Alert: Dermatophilosis by *Dermatophilus congolensis* - 9 July 2026 - PAHO/WHO | Pan American Health Organization](#)

[Suspected Sexual Transmission of Dermatophilosis among Men Who Have Sex with Men, Barcelona, Spain, 2025–2026 - Volume 32, Number 6—June 2026 - Emerging Infectious Diseases journal - CDC](#)

[Suspected Sexual Transmission of Dermatophilosis among Men Who Have Sex with Men, Lyon and Paris, France, 2025–2026 - Volume 32, Number 6—June 2026 - Emerging Infectious Diseases journal - CDC](#)

[Clusters of dermatophilosis in five EU/EEA countries in 2025–2026](#)

Il est possible de consulter cet appel à la vigilance sur le site Web de Santé Québec Chaudière-Appalaches : <https://www.cisssca.com>.

**Pour communiquer avec la Direction de santé publique,
Service des maladies infectieuses**

(Numéros confidentiels, réservés aux professionnels de la santé)

- Pendant les heures ouvrables : 418 389-1510
- En dehors des heures ouvrables : 418 389-1517
- Déclaration par télécopieur : 418 389-1560