


VACCINATION

contre la COVID-19



Conseils aux vaccinatrices et injectrices en vaccination COVID-19 chez la clientèle 5-11 ans

*Si vous avez de grandes difficultés ou malaises avec cette clientèle, en discuter avec votre gestionnaire.

MOMENT	EN TOUT TEMPS	À L'ÉVALUATION PRÉVACCINALE	PENDANT LA VACCINATION	APRÈS LA VACCINATION
Consignes	<ul style="list-style-type: none"> • Attitude accueillante, rassurante, souriante et calme. • À l'écoute, empathique. • Ne pas confronter le jeune. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Parler de façon respectueuse en tout temps. ❖ Répondre aux craintes des parents en lien avec la vaccination. ❖ Connaître les expériences passées de l'enfant avec la vaccination. ❖ Lui offrir d'aller s'allonger pour la vaccination, s'il semble hyperanxieux. ❖ Lui demander d'aller s'allonger pour la vaccination s'il est nommé que l'enfant fait des chocs vagues à tous les coups. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Lui démontrer que vous faites équipe avec lui. ○ Lui demander de détendre son muscle. Pour les plus jeunes : faire référence à mou comme du « JELL-O® ». ○ Éviter de dire que ça ne fait pas mal. ○ Éviter de dire « <i>je vais piquer</i> », mais dire « <i>maintenant, j'y vais</i> ». ○ Ne pas aspirer lors de l'injection. ○ S'assurer du bon positionnement du parent et qu'il tient bien les bras et les mains de l'enfant durant l'injection (pour les enfants de 5-6 ans généralement). ○ Le distraire pendant l'acte vaccinal. Par exemple, lui conseiller de penser à quelque chose d'agréable : cadeaux de Noël ou de fête, son animal de compagnie ou un jouet qu'il aime. ○ Lui conseiller de prendre de grandes respirations, mais lentes pendant le vaccin (nommer que ça ne durera que 3 à 4 respirations). ○ S'il questionne si douleur, nommer que c'est comme les vaccins scolaires mais qu'on le sent moins. ○ Prévoir de possibles mouvements du bras si anxiété visible. ○ Offrir la présence d'une vaccinatrice accroupie devant lui pour l'aider à respirer = marche presque à tout coup (prend 20 sec). ○ Si l'enfant veut regarder l'injection, laissez-le faire. Certains enfants supportent mieux la vaccination s'ils peuvent regarder l'injection. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Le rassurer. ✓ Le féliciter. ✓ Nommer à nos anxieux qu'ils ont vaincu leur peur! ✓ Surveillance accrue pour tous (+ + choc vagal) surtout chez nos anxieux qui ont gardé leur stress à l'intérieur. Si le jeune ne se sent pas bien, lui recommander de rester assis et de baisser la tête. Si le malaise vagal perdure, l'allonger et lever ses jambes.