DISPOSITIF D'ACCÈS VEINEUX SOUS-CUTANÉ (PORT-A-CATH)

Document d'information clinique

INTRODUCTION

Un Port-a-Cath est un boîtier avec réservoir, complètement inséré sous la peau sous la clavicule. Le cathéter étant inséré sous la peau, il n'interfère pas dans vos activités quotidiennes. Il peut demeurer en place pendant des mois voire des années, le temps nécessaire à votre traitement. Il est utilisé pour recevoir des médicaments intraveineux.

Précautions à prendre immédiatement et jusqu'à 48 heures suite à l'installation du Port-a-Cath

- Le pansement doit demeurer propre et sec :
  - Il est normal de présenter un léger gonflement, une peau bleutée ou une légère douleur ou inconfort au site d'insertion du Port-a-Cath, qui peuvent être soulagés par la prise d'un analgésique léger comme de l'acétaminophène (Tylenol®) si votre situation médicale le permet. Consulter le pharmacien communautaire au besoin;
- Il est recommandé de prendre un bain jusqu'à ce que la plaie soit complètement refermée :
  - Garder le haut du thorax hors de l'eau pour maintenir le pansement et la peau secs;
- Retirer le pansement par vous-même ou un proche aidant entre 24 à 48 heures ou selon les indications :
  - Laisser la plaie à l'air libre;
  - Les soins d'hygiène recommandés sont de nettoyer le site d'insertion à l'eau et au savon en s'assurant de bien rincer et assécher la peau après chaque soin;
  - Si la plaie a été refermée à l'aide de :
    - Colle : elle disparaîtra par elle-même;
    - Points de suture résorbables : ils disparaîtront par eux-mêmes;
    - Points de suture non résorbables : ils devront être retirés après sept à dix jours. Une prescription vous sera remise;
    - Pansements de rapprochement de type « Steristrips » : à retirer s'ils sont toujours en place après sept à dix jours ou dès qu'ils décollent. S'assurer que la plaie est refermée.

Québec

Consignes à respecter en tout temps

- Éviter les sports de contact;
- Limiter les mouvements du bras situé du côté du Port-a-Cath (ex. : lever le bras au-dessus de la tête);
- Ne pas porter de sac sur l'épaule du côté du Port-a-Cath;
- Éviter les mouvements brusques, excessifs ou répétitifs (ex. : golf, natation ou haltérophilie);
- Ne pas soulever d'objets lourds (poids supérieurs à 4 kg (10 livres) durant quatre à six semaines après l'installation.

Particularités

- Afin d'empêcher que le Port-a-Cath se bloque avec un caillot de sang entre les utilisations, celui-ci doit être irrigué à un intervalle maximal de six semaines ou après chaque utilisation par une infirmière.

Précautions à prendre lorsque l'aiguille est laissée en place

- Il arrive que le personnel infirmier laisse en place l'aiguille qui permet l'administration de médicaments dans votre Port-a-Cath;
- Voici quelques consignes à respecter :
  - Prendre un bain pour ne pas mouiller votre pansement;
  - Éviter de tirer ou d'accrocher l'aiguille dans le Port-a-Cath et la tubulure.

Retrait du Port-a-Cath

- Après discussion avec votre médecin traitant, si le retrait est envisagé, cette intervention se réalisera sous anesthésie locale.

Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Québec

Points de surveillance	Quoi faire
Présence de fièvre, frissons (38,3 °C buccale)	▪ Contacter l'infirmière du CLSC ou le service 24/7.
Douleur, chaleur, écoulement, gonflement ou rougeur au site d'insertion	
Présence d'étourdissements ou d'anxiété	
Difficulté à respirer, inconfort cardiaque	▪ Consulter à l'urgence.
Si le pansement est imbibé de sang après l'installation	▪ Le presser pendant cinq minutes avec une compresse; ▪ Contacter l'infirmière du CLSC ou le service 24/7.

Trouver du soutien

Pendant les heures d'ouverture : contacter le CLSC le plus près de chez vous afin de parler à une infirmière.

En dehors des heures d'ouverture : contacter le Service d'Info-Santé (24/7) en composant le 1 877 666-5074.

Références

CISSS de Chaudière-Appalaches, secteur Alphonse-Desjardins (2009). *Port-a-cath, informations et recommandations à l'usager en lien avec une intervention chirurgicale*.

CISSS de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce (2019). *Informations utiles sur le Port-a-Cath*.

CHUM (2016). *L'installation d'un cathéter veineux central sous-cutané ou Port-a-Cath*.

Centre d'expertise en santé de Sherbrooke (2018). Méthode de soins informatisée (MSI) : *Cadre de référence sur les soins et la surveillance des dispositifs d'accès veineux (DAV)*.

CHA Enfant-Jésus, Saint-Sacrement (2012). *Guide d'enseignement : Patient porteur d'un cathéter veineux de type Port-a-Cath*.

IUCPQ (2020). *Installation d'une chambre à perfusion implantable Port-a-Cath*.

Direction des soins infirmiers, volet pratiques professionnelles et développement clinique en collaboration avec l'équipe d'hémato-oncologie du CISSS de Chaudière-Appalaches, 2022-09

Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Québec