

ACÉTAMINOPHÈNE q. 4 à 6 h sans excéder 5 doses/24 hrs				Goutte ou suspension <sup>1</sup>	Suspension <sup>1</sup>		Comprimé à croquer <sup>2</sup>	
Groupe d'âge	Poids Kilos	Poids Livres	Doses	80 mg/1ml	80 mg/5 ml	160 mg/5ml	80 mg/co.	160 mg/co.
0-3 mois <sup>3</sup>	2,5-5,4	6-11,9	40 mg	0,5 ml	2,5 ml	-	-	-
4-11 mois	5,5-6,4	12-14,9	80 mg	1 ml	5 ml	2,5 ml <sup>4</sup>	1 co.	-
	6,5-7,9	15-17,9	100 mg	1,25 ml	5 ml	2,5 ml <sup>4</sup>	1 co.	-
12-23 mois	8-9	18-20,9	120 mg	1,5 ml	7,5 ml	3,75 ml <sup>4</sup>	1 ½ co.	-
	9,1-10,9	21-23,9	140 mg	1,75 ml	7,5 ml	3,75 ml <sup>4</sup>	1 ½ co.	-
2-3 ans	11-11,9	24-26,9	160 mg	2 ml	10 ml	5 ml	2 co.	1 co.
	12-13,4	27-29,9	180 mg	2,25 ml	10 ml	5 ml	2 co.	1 co.
	13,5-14,5	30-31,9	200 mg	2,5 ml	10 ml	5 ml	2 ½ co.	-
	14,6-15,4	32-33,9	220 mg	2,75 ml	10 ml	5 ml	2 ½ co.	-
	15,5-15,9	34-35,9	240 mg	3 ml	15 ml	7,5 ml	3 co.	1 ½ co.
4-5 ans	16-21,9	36-47,9	240 mg	3 ml	15 ml	7,5 ml	3 co.	1 ½ co.
6-8 ans	22-26,9	48-59,9	320 mg	4 ml	20 ml	10 ml	4 co.	2 co.
9-10 ans	27-31,9	60-71,9	400 mg	5 ml	25 ml	12,5 ml	5 co.	2 ½ co.
11 ans	32-43,9	72-95,9	480 mg	6 ml	30 ml	15 ml	6 co.	3 co.

<sup>1</sup> Une mesure graduée telle que la seringue doseuse permettant de mesurer précisément la quantité indiquée devrait être utilisée.

<sup>2</sup> Les comprimés doivent être écrasés pour éviter les risques d'étouffement chez les jeunes enfants < 4 ans.

<sup>3</sup> L'acétaminophène peut être administré :

- Si fièvre liée à l'administration d'un vaccin ;
- Avant la consultation médicale si l'enfant semble inconfortable ou souffrant.

<sup>4</sup> Une dose seulement pour dépanner, car il y a un risque d'erreur en mesurant la dose.

## ACÉTAMINOPHÈNE

