

## Ajustement du furosémide (Lasix<sup>md</sup>) en pharmacie communautaire chez un patient suivi à la clinique d'insuffisance cardiaque de l'Hôtel-Dieu de Lévis (CLIC)

### Quand prendre en charge ces patients en pharmacie communautaire ?

- ❖ Lorsque la CLIC est fermée (exemples : la fin de semaine ou les jours fériés) et que votre patient qui prend déjà un diurétique vous contacte en présentant un ou plusieurs signes ou symptômes d'insuffisance cardiaque :
  - Dyspnée à l'effort nouvelle ou augmentée
  - Augmentation de l'œdème des membres inférieurs ou à l'abdomen
  - Orthopnée ou dyspnée paroxystique nocturne
  - Gain pondéral de 1,4 kg ou plus en 24 heures ou 2,3 kg ou plus en 1 semaine

*L'objectif est de permettre une prise en charge de la problématique et d'améliorer les symptômes afin d'éviter une visite à l'urgence. Toutefois, en présence de signaux d'alarme ou selon le jugement du pharmacien, le patient pourrait être référé à l'urgence.*

### Suggestions :

- ❖ S'assurer au préalable que la fonction rénale du patient est stable et que la pression artérielle est aux valeurs usuelles.
- ❖ Suggestions d'ajustement temporaire (environ 48 à 72h, soit jusqu'au relai par la CLIC) :
  - Dose habituelle : 20 mg/jour → 40 mg DIE
  - Dose habituelle : 80 mg/jour → 120 mg/jour (ex : 80 mg le matin et 40 mg le midi)
  - Dose habituelle : 120 mg/jour → 160 mg/jour (ex : 80 mg BID)
  - Dose habituelle : 160 mg/jour → 240 mg/jour (ex : 120 mg BID)
  - Dose habituelle : 240 mg/jour → 320 mg/jour (ex : 160 mg BID)
- ❖ Prévoir ajout K-Dur 20 mEq DIE pour 48 à 72h si dernière kaliémie inférieure à 3,5 mmol/L
- ❖ Aucune prise de sang n'est à prévoir à court terme par le pharmacien communautaire, puisqu'il s'agit d'un ajustement temporaire et que la CLIC effectuera ensuite un suivi et prévoira les analyses de laboratoires si requises.
- ❖ Pour assurer la continuité des soins et le relais avec la CLIC :
  - Aviser le patient de laisser un message dans la boîte vocale de la CLIC. Un membre de la clinique effectuera le suivi dès que possible. **Téléphone : 418-835-7121 poste 16146**
  - Télécopier une copie de votre ordonnance d'ajustement à la CLIC, ceci aidera à en assurer le suivi. **Télécopieur : 418-835-7104**