


Algorithme pour omission de décompression



CMPQ 1-888-835-7121

L'omission de décompression peut varier entre un déficit mineur ou majeur de décompression. Certaines omissions de décompression sont le résultat d'une urgence telle qu'une remontée non-contrôlée (Blow up), une blessure grave sous l'eau, bris d'équipement ou un manque d'air. Les symptômes peuvent se développer rapidement une fois le plongeur arrivé à la surface. Il est donc important de contacter le médecin du CMPQ le plus rapidement possible. Si le plongeur développe des signes et symptômes d'accident de décompression, le traitement hyperbare est essentiel. Le plongeur ne doit jamais être laissé sans surveillance et l'administration d'oxygène est primordiale.

Protocoles de traitement pour omission de décompression

1. Traitement hyperbare table de traitement USN 5 pour :

- Plongeur **asymptomatique** avec une omission **de 30 minutes ou moins**;
- Plongeur **asymptomatique** profondeur maximale de **moins de 45 mètres (150 pieds)**

2. Traitement hyperbare table de traitement USN 6 pour :

- Plongeur **asymptomatique** avec profondeur maximale de **moins de 45 mètres (150 pieds)** et **plus de 30 minutes** d'omission;
- Plongeur **asymptomatique** avec omission de décompression suite à une plongée à **plus de 45 mètres (150 pieds)**;
- Plongeur **symptomatique** suite à toute omission de décompression.