

# MANIPULATION DES LIQUIDES BIOLOGIQUES D'UN USAGER AYANT REÇU UN MÉDICAMENT CYTOTOXIQUE (Médicament G1)

# Lit: \_\_\_\_\_

Date début:

/ /

Date fin:

/ /

## SI VOUS ÊTES UNE PERSONNE ENCEINTE

S'abstenir de tout contact avec les liquides biologiques de l'usager pendant 7 jours.

Date début:

/ /

Date fin:

/ /

## APPLIQUER LES MESURES DE PROTECTION

Jusqu'à 96 heures suivant l'administration d'un médicament G1 **OU**

En continu si médicament G1 à libération progressive ou pris quotidiennement

### Si questions, veuillez vous référer à l'assistante infirmière-chef de l'unité

Revêtir l'équipement de protection individuelle (ÉPI):

- Une blouse résistante à la chimiothérapie;
- Une paire de gant résistant à la chimiothérapie.



Si risque d'éclaboussure:

- Protection faciale et masque de procédure.

Toilette dédiée à l'usager (si impossible, utiliser matériel à usage unique avec un papier absorbant):

- Tirer la chasse d'eau 2 FOIS.




Laver le matériel dédié:

- Avec le peroxyde d'hydrogène à tous les jours.

Déposer la linge visiblement souillé dans un sac rouge cytotoxique:

- Le fermer hermétiquement et l'acheminer à la buanderie selon la procédure habituelle.



### JETER DANS UN **CONTENANT ROUGE RIGIDE ET HERMÉTIQUE IDENTIFIÉ CYTOTOXIQUE**:

- Tout le matériel contenant des liquides biologiques contaminés et le dispositif d'administration de médicament G1;
- Déchets piquants/coupants/tranchants.

### JETER LES DÉCHETS DANS UNE POUBELLE IDENTIFIÉE CYTOTOXIQUE CONTENANT UN **SAC ROUGE**:

- Culottes d'incontinence souillées dans un sac fermé;
- Équipement de protection individuelle (ÉPI);
- Matériel jetable utilisé pour l'entretien.

### SE LAVER LES MAINS AVEC EAU ET SAVON APRÈS LE RETRAIT DE L'ÉPI



Centre intégré  
de santé et de services  
sociaux de Chaudière-  
Appalaches

Québec

