

Essai d'ajustement respiratoire (Fit test) N95

Titres d'emploi priorisés

TITRES D'EMPLOI
Aide de service
Auxiliaire des soins et services sociaux (ASSS)
Brancardier
Candidate à l'exercice de la profession infirmière (CEPI)
Infirmière
Infirmière auxiliaire
Infirmière clinicienne
infirmière praticienne spécialisée
Médecin résident
Préposé aux bénéficiaires (PAB)
Préposé à l'entretien ménager (PEM)
Employés d'ergothérapie
Employés d'inhalothérapie
Employés de laboratoire
Employés de maintenance
Employés de pharmacie
Employés de physiothérapie
Employés de l'électrophysiologie, de l'imagerie médicale, de médecine nucléaire et de radiologie.
Employés de stérilisation

Tous les membres du personnel qui, dans le cadre de leur fonction, peuvent se retrouver exposés à des agents pathogènes aéroportés (par exemple un virus) ou qui peuvent être exposés à des poussières doivent effectuer un essai d'ajustement respiratoire.

Il est primordial de ne pas manger, boire (à l'exception de l'eau), fumer ou mâcher de la gomme **15 minutes avant** le test afin de ne pas altérer le sens du goût.

Il est également obligatoire, pour les hommes, de se **raser la barbe ou la moustache le matin même** de l'essai afin d'assurer une étanchéité optimale du masque lors de l'essai.